

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 13-4-70 010447

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, Maison de l'Agriculture - Bât. 5 - Place Chaptal

Boîte Postale 1078 - 34 MONTPELLIER

C.C.P. MONTPELLIER 5.238-57

Abonnement Annuel

25 F

N° 115 Avril 1970/11

1er supplément

TRAITEMENTS DE PRINTEMPS

ABRICOTIER - Les récentes intempéries diverses, pluie, gel compromettent à nouveau l'état sanitaire; la moniliose est désormais présente dans de nombreux vergers. La pourriture grise (botrytis) peut également s'installer sur les jeunes organes gelés; par ailleurs l'oïdium de l'abricotier trouve les conditions favorables à son développement. L'exécution immédiate d'un traitement anticryptogamique s'impose.

L'adjonction d'un insecticide à cette bouillie permettra par le traitement mixte de combattre l'anarsia dont les premières sorties sont imminentes, les rhynchites, les cheimatobies.

PERISIER - Dans les régions où la floraison est en cours, ou s'achève, il est nécessaire de lutter contre le Monilia. Utiliser le Thirane, la Phaltane, le Mancozèbe, le Carbatène, le Benomyl. Contre la cheimatobie, l'insecticide choisi doit l'être en fonction de la réglementation en vigueur.

PECHER - Sur cette essence, un traitement anti-monilia est également nécessaire. D'autre part, il faut prévenir l'oïdium par un traitement immédiat des arbres appartenant aux variétés sensibles à cette maladie.

PRUNIER - Cette espèce a, cette année, eu une floraison (d'ailleurs retardée pour les variétés "japonaises"), très longue - la fécondation a été souvent difficile. Il convient donc d'assurer au maximum la protection des fruits. Un traitement contre le Monilia s'impose immédiatement. Un insecticide sera ajouté partout où la présence de pucerons sera observée par un début de crispation des feuilles consécutive à la présence de pucerons.

LES MYIEBORES

Il est possible de combattre ces ravageurs dans les vergers où ils se sont manifestés au cours des années précédentes en pulvérisant le tronc et les branches principales avec une bouillie au Lindane ou au D D T. Renouveler le traitement 2 à 3 semaines plus tard. Le premier traitement sera réalisé dès les premières sorties d'insectes; ces sorties se produisent lorsque la température maximale atteint 20° C plusieurs jours de suite.

L.L. TROUILLON

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux,

P. BERVILLE

Tirage du 9 Avril 1970